

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for the most content we publish.


"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to be in contact with all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.


Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.





Appareil reproducteur féminin

Pr. A. Bouaziz



Anatomie de l'appareil génital féminin

Ovaire

• **Albuginée** : T. Conjonctif recouvrant l'ovaire

• **Épithélium germinatif** : donne cellules folliculaires.

• **Cortex** : lieu de la folliculogenèse

• **Medulla** : vaisseaux sanguins + vaisseaux lymphatiques + nerfs

Trompe de Fallope = oviducte =
trompe utérine
 $L_T = 10$ à 14 cm, Sa lumière est
tapissée par 1 épithélium de
revêtement qui change de
morphologie au cours du cycle
menstruel

Utérus : forme de poire, longueur = 6 à 7 cm, largeur = 4 cm.

Utérus


Structure

De l'ext.
vers l'int.

• **Séreuse** : épithélium de revêtement.

• **Myomètre** : muscle lisse à contraction involontaires.

• **Endomètre** : tissu conjonctif de type décidual dont la structure est fonction du cycle menstruel. Dans la couche fonctionnelle de l'endomètre (C.F.E.) qu'a lieu la nidation.



1 + 2 + 3 = Endomètre ; 4 = Myomètre ; Endomètre + Myomètre = paroi utérine
 1 + 2 = Couche fonctionnelle de l'endomètre.
 c. u. = Cavité utérine

Col utérin : passage étroit séparant la cavité vaginale de la cavité utérine.

Glandes exocrines du col

sécrètent



- La glaire cervicale : indispensable pour la filtration des spz.

- Des sécrétions (pertes) : translucides ou laiteuses, elles sont indispensables pour le nettoyage de la cavité vaginale.

Vagin : conduit de copulation

Vagin



• **Muqueuse** : épithélium de revêtement,
Dont la morphologie est fonction du cycle menstruel.

• **Musculeuse** : 2 couches de muscles lisses (externe épaisse, interne mince).

Organes génitaux externes




Figure 3. Organes génitaux externes

Organes génitaux externes




- Clitoris
- Grandes lèvres
- Petites lèvres
- Glande de Bartholin
- Hymen

Ovogenèse

Elle débute vers le 18^{ème} jour du développement et se continue jusqu'à la naissance. Ensuite, elle s'arrête jusqu'à la puberté, ou elle reprend jusqu'à la ménopause.

L'ovogenèse a lieu de la puberté jusqu'à la ménopause, une fois par mois juste après les règles.



Comment peut on différencier entre l'O_I, l'O_{II} bloqué en métaphase 2, l'O_{II}, l'ovule et le zygote ?

